


ORDINE TRICOTTERI (capo ben sviluppato – mandibole robuste – 3 segmenti toracici ognuno con 1 paio di zampe – 10 segmenti addominali l'ultimo dei quali con ciuffi)



larva 10 - 20 mm



astuccio


**Famiglia
Hydropsychidae**

Hydropsyche pellucidula
(specie diffusa in Italia)

Capo relativamente piccolo, mandibole robuste, tracheobranchie toraco-addominali ventrali molto evidenti, ramificate. Pigopodi sviluppati (paio di artigli dell'ultimo segmento addominale che hanno la funzione di ancorare la larve all'astuccio).



larva 25 - 28 mm




loggetta pupale
e bozzolo
25 - 30 mm

**Famiglia
Rhyacophilidae**

Rhyacophila dorsalis

Larve con capo piccolo, rettangolare, allungato. Tracheobranchie toraciche e addominali. Pigopodi sviluppati. Predatrici, vivono libere in ambienti bene ossigenati con fondi ciottolosi.

Famiglia Limnephilidae



(famiglia diffusa in Italia)

Famiglia con larve di varie dimensioni, zampe anteriori corte. Costruiscono foderi di varie forme.

Ogni fodero indica la presenza di una differente specie di Tricottero della Famiglia Limnephilidae.



Tricottero adulto 25 mm